

	A	B	C	D	E	F	G
1						Fórmulas utilizadas:	
2	Clientes	Compra	Descuento	Valor Compra		descuento	valor compra
3	Lucía	Q 5,700.00	Q 200.00	Q 5,500.00		=SI(B3 >= 5000; 200; 0)	=B3 - C3
4	Pedro	Q 2,480.00	Q -	Q 2,480.00		=SI(B4 >= 5000; 200; 0)	=B4 - C4
5	Nancy	Q 6,930.00	Q 200.00	Q 6,730.00		=SI(B5 >= 5000; 200; 0)	=B5 - C5
6	Luis	Q 3,900.00	Q -	Q 3,900.00		=SI(B6 >= 5000; 200; 0)	=B6 - C6
7	Ana	Q 4,050.00	Q -	Q 4,050.00		=SI(B7 >= 5000; 200; 0)	=B7 - C7
8	Carlos	Q 3,450.00	Q -	Q 3,450.00		=SI(B8 >= 5000; 200; 0)	=B8 - C8
9							
10	Nuestro cliente obtendrá un descuento de Q200.00 por la compra de nuestros Productos						
11	que sea de Q 5,000.00 en adelante.						

SI Anidado

CAMPEONATO DE FUTBOL

Fórmulas utilizadas:

Grupo 1	Goles	Grupo 2	Goles	Resultado Grupo 1
Holanda	4	Belgica	2	
Brasil	1	Escocia	1	
Italia	0	Bulgaria	2	
Argentina	2	Francia	1	

En el siguiente campeonato se evalúa cada partido del Grupo 1, dependiendo de los goles si es **Ganador, Perdedor o Empate**.

Condiciones:

Si los goles del Grupo1 > goles Grupo 2 = Ganador

Si los goles del Grupo1 < goles Grupo 2 = Perdedor

Si los goles son iguales = Empate

19 El SI anidado consiste en utilizar una función dentro de otra función.
20 Se llama a la función SI en uno de los argumentos de la función SI original.

21
22 Sintaxis:

23 `=SI(expresión_lógica; opción1; SI(expresión_lógica2; opción2; opción3))`

24 
25 valor si es verdadero valor si es falso

CAMPEONATO DE FUTBOL

Grupo 1	Goles	Grupo 2	Goles	Resultado Grupo 1
Holanda	4	Belgica	2	Ganador
Brasil	1	Escocia	1	Empate
Italia	0	Bulgaria	2	Perdedor
Argentina	2	Francia	1	Ganador

Fórmulas utilizadas:

`=SI(B5>D5; "Ganador"; SI(B5<D5; "Perdedor"; "Empate"))`

`=SI(B6>D6; "Ganador"; SI(B6<D6; "Perdedor"; "Empate"))`

`=SI(B7>D7; "Ganador"; SI(B7<D7; "Perdedor"; "Empate"))`

`=SI(B8>D8; "Ganador"; SI(B8<D8; "Perdedor"; "Empate"))`

	A	B	C	D
1	Nombre	Nota	Resultado	
2	Karen	95	Bueno	=SI(B2<60; "Malo"; SI(B2<80; "Regular"; "Bueno"))
3	Laura	72	Regular	=SI(B3<60; "Malo"; SI(B3<80; "Regular"; "Bueno"))
4	Mauricio	38	Malo	=SI(B4<60; "Malo"; SI(B4<80; "Regular"; "Bueno"))
5	Norberto	95	Bueno	=SI(B5<60; "Malo"; SI(B5<80; "Regular"; "Bueno"))
6	Patricia	62	Regular	=SI(B6<60; "Malo"; SI(B6<80; "Regular"; "Bueno"))
7				

	A	B	C	D
1	Nombre	Edad	Grupo de Edad	
2	Karen	20	Adulto	=SI(B2<12; "Niño"; SI(B2<18; "Adolescente"; "Adulto"))
3	Laura	15	Adolescente	=SI(B3<12; "Niño"; SI(B3<18; "Adolescente"; "Adulto"))
4	Mauricio	10	Niño	=SI(B4<12; "Niño"; SI(B4<18; "Adolescente"; "Adulto"))
5	Norberto	9	Niño	=SI(B5<12; "Niño"; SI(B5<18; "Adolescente"; "Adulto"))
6	Patricia	33	Adulto	=SI(B6<12; "Niño"; SI(B6<18; "Adolescente"; "Adulto"))
7	Rosario	7	Niño	=SI(B7<12; "Niño"; SI(B7<18; "Adolescente"; "Adulto"))
8	Tomás	14	Adolescente	=SI(B8<12; "Niño"; SI(B8<18; "Adolescente"; "Adulto"))
9	Ulises	11	Niño	=SI(B9<12; "Niño"; SI(B9<18; "Adolescente"; "Adulto"))